



Artículo Aceptado para su pre-publicación / Article Accepted for pre-publication

Título / Title:

Bloqueo del axis celiaco en dolor por cáncer: medicina de oportunidad / Celiac axis block in cancer pain: medicine of opportunity

Autores / Authors:

Ricardo Plancarte Sánchez, B. Carolina Hernández-Porras

DOI: [10.20986/resed.2019.3787/2019](https://doi.org/10.20986/resed.2019.3787/2019)

Instrucciones de citación para el artículo / Citation instructions for the article:

Plancarte Sánchez Ricardo , Hernández-Porras B. Carolina. Bloqueo del axis celiaco en dolor por cáncer: medicina de oportunidad / Celiac axis block in cancer pain: medicine of opportunity. Rev. Soc. Esp. Dolor. 2019. doi: 10.20986/resed.2019.3787/2019.

Este es un archivo PDF de un manuscrito inédito que ha sido aceptado para su publicación en la Revista de la Sociedad Española del Dolor. Como un servicio a nuestros clientes estamos proporcionando esta primera versión del manuscrito en estado de pre-publicación. El manuscrito será sometido a la corrección de estilo final, composición y revisión de la prueba resultante antes de que se publique en su forma final. Tenga en cuenta que durante el proceso de producción se pueden dar errores lo que podría afectar el contenido final. El copyright y todos los derechos legales que se aplican al artículo pertenecen a la Revista de la Sociedad Española de Dolor.

Editorial

Bloqueo simpático en dolor visceral por cáncer: “Medicina de oportunidad y precisión”

Sympathetic block in visceral cancer pain: “ Medicine of opportunity and precision ”

Ofrecer a un paciente con dolor por cáncer el mejor abordaje terapéutico y analgésico con el objetivo de mejorar su calidad de vida ha sido motivo de estudio en las últimas décadas. Esta enfermedad, puede presentarse de manera frecuente en pacientes con cáncer, estimándose una prevalencia de dolor en el 70% de los pacientes con enfermedad avanzada. El algoritmo de la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, constituyó un “parteaguas” en el tratamiento del dolor oncológico y la analgesia multimodal. El intervencionismo en dolor, de igual manera ha desarrollado avances tecnológicos y técnicas que son en la actualidad más seguras. Dentro del dolor mediado por el simpático, se identifican puntualmente sitios donde se puede interrumpir funcionalmente el sistema nervioso simpático (SNS). Estos bloqueos o inhibiciones se ejecutan con finalidades diagnósticas, pronósticas o terapéuticas.

El conocimiento de la anatomía, es fundamental en cualquier tratamiento intervencionista o quirúrgico. La compleja, pero susceptible al abordaje, anatomía del SNS, ha permitido desarrollar técnicas ablativas para tratamiento del dolor.

Existen múltiples estudios anatómicos que evidencian que los nervios espláncnicos participan en la inervación de las vísceras del hemiabdomen superior. El esófago, es inervado por el plexo esofágico, éste se conforma por los troncos vagales y los troncos simpáticos torácicos a través de los nervios espláncnicos mayores (abdominopélvicos) y los plexos periarteriales que rodean la arteria gástrica izquierda y frénica inferior izquierda. El plexo celiaco recibe inervación preganglionar de los nervios espláncnicos mayores en su porción superior, y en su parte más baja se segmenta en el ganglio aórtico renal, que a su vez recibe inervación por los nervios espláncnicos menores. El plexo celiaco inerva hígado, vesícula biliar, estómago, páncreas, bazo, ambos riñones, intestino delgado y la porción ascendente y transversa del colon. (1,2)

En el caso particular del eje celiaco, como se puede observar en la **Figura 1**, se identifica un único sitio susceptible a ser interrumpido en dos estructuras anatómicas para un mismo fin. Esta estructura, denominada axis celiaco se encuentra integrado por los nervios espláncnicos (NE) y plexo celiaco.

Hemos postulado y publicado anteriormente nuestra preferencia por inhibir los NE sobre el plexo celiaco. La razón es que anatómicamente, la cúpula diafragmática, puede representar una barrera que protege a los NE de invasión tumoral, a diferencia del plexo celiaco, el cual se encuentra expuesto a invasión por

contigüidad y linfática. Éste último se encuentra expuesto a alteraciones anatómicas como consecuencia de actividad tumoral, inflamación, cambios postradioterapia, fibrosis y/o adherencias postquirúrgicas. Por lo tanto, los NE ofrecen un blanco terapéutico con menos posibilidades de infiltración tumoral.

En la actualidad, existen diversas áreas de oportunidad y preguntas sobre dichas técnicas. Por ejemplo, el número de abordajes y la elección del tipo de denervación. La neurolísis química puede ofrecer la oportunidad de realizar un abordaje unilateral mientras que en la neurolisis térmica, requeriremos dos abordajes o un solo abordaje modificando la posición de la aguja para lograr cubrir el territorio que se desea denervar. Existen ambos tipos de estudios, donde se favorece a la radiofrecuencia del ganglio celiaco versus la neurolisis química. Sin embargo, en el territorio de los NE, la neurolísis química puede, por su capacidad de distribución y difusibilidad del agente, abarcar estructuras de relevo como las *rami comunicantes* versus las lesiones localizadas por radiofrecuencia.

Otra pregunta por resolver, es si la combinación de los dos abordajes en un mismo tiempo (bloqueo de plexo celiaco y nervios espláncnicos) puede ofrecer verdaderamente los beneficios descritos en los ensayos. Por otro lado, los tipos de neurolíticos utilizados alcohol versus fenol, el mejor nivel intervertebral para inhibir los NE, incluso el volumen óptimo de administración del neurolítico, también seguramente serán motivo de estudio presente y futuro.

Clásicamente el 10% de los pacientes con cáncer presentan dolor de difícil control o intratable y se les considera candidatos a procedimientos invasivos para tratamiento de dicho dolor(3) En el elaborado trabajo de revisión de este número de RESED se analizan los temas comentados. Herrero y cols., proponen un algoritmo intrevencionista en dolor visceral por cáncer de páncreas cuando el paciente refiere una intensidad por escala visual análoga (EVA) mayor o igual a 7 ó una dosis de morfina diaria mayor o igual a 90 mg. Nuestra experiencia en pacientes con dolor moderado (4), EVA >4, ha mostrado que esta población puede beneficiarse de inhibirlos tempranamente. Sugerimos no esperar a que el paciente sea expuesto al sufrimiento de un dolor incapacitante, si este puede ser tratado a tiempo. Por ejemplo, si nuestra conducta clínica en este grupo de pacientes espera a que el síntoma (dolor) se torne intratable o refractario, el mismo criterio no se consideraría adecuado en un paciente diabético en el que se esperaría indicar un tratamiento más “agresivo” o esperar a tratarlo a partir de un determinado rango elevado de hiperglucemia.

Este concepto particularmente se aplica cuando se conoce la fisiopatología y la evolución de entidades en las que puede anticiparse la denervación del sistema simpático. En el caso de los pacientes con cáncer de páncreas irresecable, donde la evidencia aporta elementos a favor del bloqueo en cuanto a su seguridad y eficacia. Pudiendo entonces integrarse el concepto de bloqueo temprano en pacientes que así lo ameriten.

Así mismo, en esta revisión se han mencionado y considerado las diferentes estructuras del eje celiaco y técnicas existentes en la actualidad incluyendo la

neurolysis ecoendoscópica. De igual manera el bloqueo diagnóstico previo ha quedado, con base a la literatura existente en controversia.

La necesidad de controlar el dolor mediado por el sistema simpático requiere de una evaluación integral en donde la anatomía del paciente, semiología y condiciones clínicas se discutan con el objetivo de realizar las mejores indicaciones en cuanto a la elección del abordaje, y tipo de lisis de cada paciente evaluado.

Ricardo Plancarte Sánchez
B. Carolina Hernández-Porras

Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología . Universidad Nacional Autónoma de México.

@: planky@incan.edu.mx

Referencias

1. Moore K, Dalley A, Agur A. Anatomía con orientación clínica. 2010 España. 6ta edición. Wolters Kluwer.
2. Kambadajone A, Gervais D, Mueller P. Et al. CT guided celiac plexus neurolysis: A review of anatomy, indications, technique, and tips for successful Treatment. Radiographics 2011 31(6): 1599-1621.
3. Fallon M, Guiusti R, Aielli F. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann of Onc 2018 (29)4:iv66-iv91.
4. Plancarte R, Guajardo-Rosas J, Reyes-Chiquete D, Chejne-Gómez F, Plancarte A, González-Buendía NI, et al. Management of chronic upper abdominal pain in cancer: transdiscal blockade of the splanchnic nerves. Reg Anesth Pain Med. 2010;35(6):500-6.